dorsalibus, apicem haud attingentibus. Femoribus compressis, anticis et posticis subter longitudinaliter impressis ac scobaceis, tibiis anticis et intermediis curvatis.

Long. 37 mm., lat. ad hum. 11,5, antennar. long. 22 mm.

Patria. Africa occidentalis, Guinea superior, Togo, ex montibus. (Typus in Mus. Dresdense, No. 11331.)

Unterseite und Fühler heller, Kopf und Thorax dunkler rötlich braun, sehr fein rötlich gelb tomentirt, nur die Decken ockergelb, an der Wurzel etwas dunkler und ganz kahl. Kopf sehr fein gerunzelt, am Scheitel mässig dicht und fein punktirt. Fühlerglieder vom dritten ab nach der Spitze zu an Länge zunehmend, ähnlich wie bei *Closterus* in einen flach gedrückten Fortsatz ausgezogen, der an der Basis am schmalsten und nach der Spitze zu etwas verbreitert ist und stumpf endigt. Das letzte Fühlerglied ist einfach, länger als die zwei vorhergehenden zusammen und überragt um die Hälfte seiner Länge die Fortsatzspitze des vorletzten. Halsschild kaum $1^1/_2$ mal so breit wie lang, mit vollkommen gerundeten Vorder- und Hinterecken, vorn und hinten fein gerandet, sehr fein gerunzelt, die Seiten nach hinten divergirend, hinter der Mitte mit einem nach hinten gerichteten conischen Zapfen bewehrt und im basalen Drittel fast parallel; der Hinterrand beiderseits leicht gebuchtet, innerhalb des Seitenrandes vor der Mitte je ein, auf der Scheibe drei grosse, schwärzlich gefärbte flache Eindrücke, einer in der Mitte nahe dem Vorderrande und zwei beiderseits hinter der Mitte; vor letzteren befindet sich je ein kleiner Höcker, zwischen ihnen eine fast quadratische Schwiele. Schildchen dunkelbraun, leicht concav, äusserst fein und mässig dicht punktirt. Flügeldecken flach gewölbt, ziemlich dicht und fein, nach der Spitze zu undeutlich punktirt, an der Schulter am breitesten, an der Spitze kaum merklich einzeln abgerundet, Randsaum im basalen Drittel gewölbt und doppelt so breit als in der Mitte der Decken, mit vier feinen, etwas erhabenen Längsstreifen, einer dicht an der Naht, zwei an der Wurzel sich nähernde und weit vor der Spitze sich vereinigende, auf der Scheibe, und eine dicht innerhalb des Seitenrandes der Decken. Alle Schenkel flach gedrückt, die mittleren, die breitesten, fast gestreckt-elliptisch, die hinteren ziemlich parallelseitig. Vorder- und Mittelschienen stark gekrümmt, Hinterschienen gerade nach der Spitze zu verbreitert.

Das Museum verdankt die interessante Art Herrn Wilhelm Spemann (Dresden-Blasewitz), in dessen Sammlung sich noch ein zweites Exemplar von derselben Localität befindet.

Litteratur.

Die mittleren Hochländer des nördlichen Deutsch-Ost-Afrika. Wissenschaftliche Ergebnisse der Irangi-Expedition 1896—1897 nebst kurzer Reisebeschreibung. Im Auftrage der Irangi-Gesellschaft herausgegeben von dem Führer der Expedition C. Waldemar Werther, Premier-Lieutenant à la suite des 2. Pommerschen Feld-Artillerie-Regiments No. 17. Unter Mitwirkung der Herren: Dr. Bruno Hassenstein, Professor Dr. F. Karsch, H. J. Kolbe, Professor Dr. F. von Luschan, P. Matschie, Professor Dr. A. Reichenow, A. Seidel, L. von Tippelskirch, Dr. G. Tornier, Dr. E. Wagner und G. Witt. Mit 5 Vollbildern und 126 Text-Illustrationen in Photogravüre, Lichtdruck, Lithographie und Autotypie, sowie 2 Original-Karten von Dr. B. Hassenstein und Prem.-Lieut. Werther. Berlin, Verlag von Hermann Paetel, 1898. — 497 Seiten in Quart.

Entomologischer Inhalt:

H. J. Kolbe, Coleoptera, gesammelt von Prem.-Lieut. Werther in der Massaisteppe, Seite 305—310 [erwähnt und beschrieben sind 5 Spezies; Anthia artemis Gerst., Adesmia (Macropoda) nigrogemmata Fairm. und tuberculifera Kolbe (1894), Rhytidonota acuticollis Fairm. und Brachycerus phrynopterus Fairm.].

F. Karsch, Ueber die auf der Irangi-Expedition gesammelten Orthoptera und Lepidoptera, Seite 311—317, mit 2 Tafeln (♂ und ♀ der Stabschrecke: Palophus reyi Grandidier) [aufgeführt werden zwei Orthopteren: Palophus reyi (Grandid.) sowie Enyaliopsis petersi (Schaum) und 25 Arten Lepidopteren, darunter als neu: Trypanus kwouus ♀ p. 312 von Ufiome, Spilosoma investigatorum ♂ ♀ p. 313 von Bagamoyo, Tanga, Moschi uud Dar-es-Salâm, Bunaea ammon ♀ p. 314 von Mangati und Tewe und Papilio echerioides Trimen var. Wertheri ♀ p. 315 von Mangati].

---

26. Jahres-Bericht der Zoologischen Sektion des Westfälischen Provinzial-Vereins für Wissenschaft und Kunst für das Etatsjahr 1897—98. Vom Sekretär der Sektion H. Reeker. Münster, Regensberg, 1898. — 79 Seiten.

Entomologischer Inhalt:

R. v. Hanstein, Fritz Müller †. Nachruf. Seite 11—15. — Reeker, Über die Eiablage des Maikäfers. S. 17; Über den In-

stinkt der Bienen. S. 22—23; Über das Leben der Ameisen. S. 54—59. — Landois, Über die San José-Schildlaus. S. 62—65.

Psyche, a Journal of Entomology, published by the Cambridge Entomologcal Club, Cambridge Mass. No. 268, 269, 270, 271, 272. (Vol. VIII.) August, September, October, November, December 1898.

Inhalt:

Kellogg, V. L., A Problem in Distribution. Pg. 243. — Morse, A. P., Notes on New England Acridiidae. IV: Acridiinae I, II, III, IV (with plate). Pg. 247, 255, 269, 279. Acridiinae V. 292. — Dyar, H. G., Six new or little known Larvae of Pterophoridae. Pg. 249. — Ashmead, W. H., Thynnidae in the United States. Pg. 251. — Cockerell, T. D. A., A new Hemileuca. Pg. 252. — Baker, C. F., On some new and anomalous Tettigoninae. Pg. 260. — Cockerell, T. D. A., The Cercid Solenophora in the United States. Pg. 262. — Scudder, S. H., Palisot de Beauvois' work on the Insects of Africa and America. Pg. 263. — Townsend, C. H. Tyler, Diptera of the Organ Mountains in Southern New Mexico. II. Pg. 267. — Dyar, H. G., A new Parasa, with a preliminary table of the species of the genus. Pg. 273. — Ashmead, W. H., Some new genera of Bees. Pg. 282. — Baker, C. F., New Tettigoninae, with notes on others. Pg. 285. — King, G. B., and Cockerell, T. D. A., A new form of Pulvinaria. Pg. 286. — Janet on Myrmecophilous Animals. Pg. 287. — Cockerell, T. D. A., Note on three Pyralid Moths of the genus Pachyzancla. Pg. 288. — Hunter, S. J., On the occurrence of Dissosteira longipennis Thomas. Pg. 291. — Entomological Expeditions (R. E. Snodgrass, C. F. Baker). Pg. 296. — King, G. B., Tinsley, J. D., A new Ant-nest Coccid (illustrated). Pg. 297. — Cockerell, T. D. A., Second note on a new Hemileuca. Pg. 298. — Soule, C. G., A curious Cocoon of Attacus cecropia. Pg. 298. — Hunter, S. J., Dissosteira in Colorado. Pg. 299. — Soule, C. G., Callidryas eubule. Pg. 299. — Proceedings of the Cambridge Entomological Club. Pg. 299.

Journal of the New York Entomological Society, devoted to Entomology in general. Edited by W. Beutenmüller. Vol. VI., No. 3. September 1898. New York. —